



Manometria e pHmetria Esofágica

ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES

Orientações gerais para a realização do exame.

- *Manter um período de jejum de seis a oito horas (em casos que o paciente seja portador de esôfago dilatado ou megaesofago, o período de jejum deve ser estendido para doze horas) antes do exame.*
- *Trazer exames relacionados ao esôfago já realizados anteriormente (raio-x do esôfago, endoscopia, pHmetria e cintilografia).*
- *Trazer exames já realizados de outras especialidades que podem ajudar no caso de diagnostico diferencial (eletrocardiograma, ecocardiograma, expirometria e videolaringoscopia)*
- *Suspender os medicamentos que contenham os seguintes componentes (ver na bula):*
 - *Suspender 24 horas antes do exame:*
 - *Nitratos:*
 - *Nitroglicerina; dinitrato de isorbida*
 - *Bloqueadores dos canais de cálcio:*
 - *Nifedipina; Verapamil; Diltiazem*
 - *Procineticos:*
 - *Metoclopramida; Bromoprida; Cisaprida; Betanecol*
 - *Suspender uma semana antes do exame:*
 - *Bloqueadores H2:*
 - *Cimetidina; Ranitidina; Nizaditina; Famotidina*
 - *Inibidores da bomba de prótons:*
 - *Omeprazol; Lanzoprazol; Pantoprazol*
 - **Qualquer dúvida entrar em contato: 019- 32311583**